

醫

方

集

解

醫方集解卷之三

休寧訥菴汪

昂暑輯

男其兩汪端

弟殿武汪

桓叅閱

姪子錫汪惟寵

理氣之劑

經曰諸氣鬱結甘屬于肺又曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗

則氣結

焦總統子卿外黃中氣也天人身之所時以生者此氣

大并降

夜有常易常虧于天機至七情交攻五志並發乖戾

氣者身之

是火也人身有宗氣此氣所謂五志過極者為火丹溪所謂

諸發症矣

無病之時宜保之於之和之順之而作之時當其可經

何病寒熱虛

實而補瀉之

補升陽中

補中益氣湯

治煩勞內傷身熱心煩頭痛無寒懶言食味大而

虛或喘或嘔

陽虛自汗宜本湯加麻黃根浮小麥升柴世宜蜜或氣

虛不能攝血以瘡痢脾虛久不愈一切清陽下陷中氣不足之症中

脾胃也藏府肢體皆稟氣于脾胃飢飽勞役傷其脾胃則稟氣以裏氣而皆病矣陽氣不陷則陰火大秉放熱而煩非實熱也頭者諸陽之會清陽不升則濁氣上逆故頭痛其痛或作或止非如外感頭痛不仁也陽虛不能衛外故惡寒自汗氣虛故懶言即虛故惡食脾胃虛則火上升肺故喘金受火尅不能生水故渴脾虛不能統血則血妄行而吐下清陽下陷則為瀉痢氣血兩虛則嘔不止名瘧瘵瘵老也○李東垣內傷外感辨傷于飲食勞役七情六慾為內傷傷于風寒暑濕為外感內傷發熱時熱時止外感發熱熱甚不休內傷惡寒得暖便解外感惡寒雖厚衣烈火不除內傷惡風不畏風反畏隙風外感惡風見風便惡內傷頭痛乍痛乍止外感頭痛連痛不休直待表邪專長方置內有濕或不作渴或心火乘肺亦作燥渴外感須二三口外表熱高裏口方作渴內傷則熱傷氣四肢沉困無力怠倦嗜睡外感則風傷筋傷寒骨一身筋骨疼痛內傷則短氣不則以息外感則喘滿氣盛有停內傷則手心熱外感則手背熱天氣通于脾胃者脾之外候外感傷寒則流涕然能飲食口知味腹中和二便如常地氣通于脾胃者脾之外候內傷則懶言惡食口不知味小便頻數赤大便或秘或泄上迎內傷證屬不足宜溫宜補宜和外感證屬有餘宜汗宜吐宜下右內傷之症候作外感妄發其表重虛元氣補如反掌故立補中益氣湯主之又有內傷外感兼病者若內傷重者宜補養為先外感重者宜發散

為急此湯惟上焦痰喘中焦
濕熱傷食膈滿者不宜服

黃耆

蜜炙錢半

人參

甘草

錢炙一

白朮

炒土

陳皮

白蜜歸分

五升

麻分

三

柴胡

分三

薑三片

棗二枚

煎如血

不足

加當歸

精神短

少

加人參

五味

肺熱咳嗽

去人參

噤乾

加葛根

風藥多燥葛根獨能止渴者以其

能升胃中清氣入肺而生水耳

頭痛

加蔓荊子

痛甚

加川芎

腦痛

加藁本

細辛

風濕相搏

一身盡痛

加羌活

防風

有痰

加半夏

生薑

寒氣滯

加青皮

薤仁

木香

益智

腹脹

加枳實

厚朴

木香

砂仁

腹痛

加白芍

甘草

熱痛

加黃連

能食

而心下痞

加黃連

咽痛

加桔梗

有寒

加肉桂

濕勝

加蒼朮

陰火

加黃柏

知母

陰虛

去升麻

加熟地

山茱萸

藥大

便秘

加酒煨

大黃

咳嗽

加旋覆

疑冬

夏加麥冬

五味秋

加麻黃

黃芩

冬加不去根

節麻黃

天寒

加乾薑

泄瀉

去當歸

加

茯苓

蒼朮

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

三

通

中

益氣

此足太陰陽明藥也肺者氣之黃耆補肺固表為君脾者肺之本上

生金脾胃一人參甘草補脾益氣和中瀉火為臣東垣曰參耆甘草瀉

虛肺氣先絕甘溫以補元氣白朮燥濕強脾當歸和血養陰為佐補

而虛熱自退故亦謂之瀉和陰不然升麻以升陽明清氣其木位柴胡以升少陽清氣上行

則已亢陽升則萬物生清升則陰濁降加陳皮者以通利其氣陳皮同補藥則

生薑辛溫大棗甘溫用以和營衛開腠理致津液諸虛不足先建其中

中者何脾胃是也李東垣曰脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而承其

脾胃一虛肺氣先絕故同黃耆以益皮毛而固腠理不令自汗上喘氣

短故以人參補之心火乘脾用炙甘草溫以瀉火熱而補脾元若脾胃

急痛併大虛腹中急宿宜多用之中滿者瀉之白朮苦甘溫除胃中之

熱利腰膝間血胃中清氣在下必加升麻柴胡以升之引參耆甘草甘

溫之氣味上升以補胃氣之散而實其表又緩帶脈之縮急氣亂于中

清濁相干用去白陳皮以理之又助陽氣上升以散滯氣脾胃氣虛為

陰火傷其生火之氣營血大虧血滅則心無所養致令心滿而煩病名

曰挽故加甘辛微溫之劑生陽氣伸其之法血虛以人參補之陽旺則

能生陰血更以當歸和之少加黃柏以救腎水湯陰中伏火如煩猶不止少加生地黃補腎水水旺則心火自降李士初曰虛人感冒不任發散者此方可以代之東垣曰肌熱者表熱也凡此湯一二服得微汗則已非正發汗乃陰陽氣和自然汗出也準繩曰凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君子加發散藥血虛者四物湯加發散藥無汗者用神木湯有汗者用白木湯治剛痙神木湯加羌活麻黃治風濕無汗者用神木湯有汗者用白木湯治剛痙神木湯加羌活此皆仲景所謂辛甘之入獨胃之病傷寒是也明儒若云發熱有數種治各不同仲景論傷寒陽風此外感也故宜發表以解散之麻黃桂枝之義也感于寒冷之月即時發病故用辛熱以勝寒如春溫之力則當變以辛涼之藥夏暑之月則當變以甘若寒之劑又有冬溫此天時不正陽氣反泄用藥不可濕熱又有寒疫却在溫熱之時此陰氣反逆用藥不可寒涼又有瘟疫沿門闔境相似者此天地之厲氣當隨時令參氣運而治宜辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒若夫飲食勞倦為內傷元氣則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足也又有勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而勞加火是謂陰虛火旺勞瘵之症此丹溪發陽有餘陽不足之論用四物加黃柏知母補其陰而火自降此用血藥以補血之不足者也又有夏月傷暑之病雖屬外感却云內傷東垣所言者蓋氣是也又有因暑熱而過食冷物以傷之內或過取風涼以傷其表此則非暑傷人乃因暑而致之病治宜辛甘解表辛溫

理中之藥與傷寒治法相類者也外感之與內傷寒病之與熱病氣
虛之與實如小炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣醫貫曰
傷寒書而不讀東垣書則內傷不明而殺人多矣東垣脾胃論深明脾胃
丹溪書則陰虛不明而殺人多矣東垣脾胃論深明脾胃丹溪書則陰虛
症俱是內傷悉類傷寒切戒汗下以為內傷多而外感少只須溫補不
必發散如外感多內傷少溫補中少如發散則補中益氣為主如內傷
兼寒者加麻黃兼風者加桂枝兼暑者加黃連兼濕者加羌活等也
無疆之利此東垣特發陽虛發熱之一門也然陰虛發熱者十之六七
亦類傷寒今人一見發熱則曰傷寒須用發散發散而斃則曰傷寒之
法已窮余嘗于陰虛發熱者見其大熱而赤口渴煩躁與六味地黃丸
一大劑即愈如下部惡寒足冷上部渴甚燥極或飲而反吐即加肉桂
五味甚則加附子冷飲以此活人多矣此丹溪發明陰虛發熱之外尚
遺未盡本方除當歸白朮加水香蒼朮名調中益氣湯治脾胃不調
之意也

腦滿肢倦食少短氣口不知味心不和則及食入反出本方加白芍五味

子亦名調中益氣湯東垣治氣虛多汗餘治同前補中湯純用甘溫所謂

加白芍五味之陽以收耗散之氣有發有本方加蒼朮倍分半夏黃芩

各三分名參朮益胃湯東垣治內傷勞倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃

本方去白朮加草寇神麴半夏黃柏名升陽順氣湯東垣治飲食勞倦所

傷滿悶短氣不思食不知味時惡寒吳鶴皋曰升柴辛甘升其清滑升

降則陰氣順矣參者甘草當歸補其虛虛補則正氣順矣半夏陳皮利

其膈膈利則痰氣順矣豆蔻神麴消其食食消則穀氣順矣東垣曰升

麻柴胡味薄性陽引脾胃清氣行于陽道以滋腎氣之和艾引參耆甘

草上行流實際理使衛外為固此補脾胃之藥多以升陽補氣名之者

此也又曰但言補之以辛甘溫熱之劑及味之薄者謂風藥是也此助

春夏之升浮者也此便是瀉秋收冬藏之藥也在人之身乃升也但

言為之以酸苦寒涼之劑併淡味滲泄之藥本方加炒芍神麴名益胃

此助秋冬之沉降者也在人之身是肺腎也

升陽湯東垣治婦人經水不調或脫血後食少水瀉東垣曰脫血益氣古

氣以助生本方加黃柏生地名補中益氣加黃柏生地湯治陰火乘陽

發之氣發熱晝甚自汗短氣口渴無味本方加白芍細辛川芎蔓荊名順氣抑

中湯寶鑑治清陽不升頭痛惡風脉弦微細本方加羌活防風細辛川芎

名調榮養衛湯治勞力傷寒身痛體熱惡寒微渴汗出身痛脉浮無

名調榮養衛湯

力

順氣
祛風

烏藥順氣散

嚴用和

治中風遍身頑麻骨節疼痛步履艱難語言蹇澁口

眼喎邪喉中氣急有痰

風勝則氣壅壅于皮膚則頑麻壅于骨節則頑

于胸喉則痰喘

烏藥

橘紅二錢

麻黃

川芎

白芷

桔梗

枳殼

炒一錢

僵蚕

薑

甘草分

加薑葱煎

虛汗者

去麻黃

加黃耆

手足不能舉動加

防風續斷威靈仙拘攣加木瓜脚氣加牛膝五加皮酒活

此手太陰足厥陰藥也風盛則火熾故有痰火衝逆而上此裏氣逆也

然中風必由外感風寒而發內虛而外邪乘之此表氣逆也麻黃桔梗

肺家之藥發汗而祛寒川芎白芷頭面之藥散風而活血

風散則

枳桔

利氣行痰

順氣正以行痰

僵蚕

清化散結

東瀛風則

因以治風

能散相火

逆結之

氣散

痰黑蓋溫經通陽甘草和中瀉火烏藥能通氣滯諸氣此乃先解表

氣而兼順氣者氣順則風散風邪卒中常先治標若氣虛病人者非

所宜也脈道痰積口紫脈伏身溫為中風身冷為中氣中風多痰涎中

學士云暴起傷腦者初傷腦發熱不以為多風運往往得中氣之症不

可作中風治者必與氣先虛榮衛空疎邪乃求虛而入者內因七情得者

邪為能為害必與氣先虛榮衛空疎邪乃求虛而入者內因七情得者

法當調氣不當治風外因六淫得者亦先當治氣後以所感六氣治之

此其治也宜八味調氣散方用人參白朮茯苓甘草芍藥正先治發後治風之妙自後人或

藥併不用前方和後方調養風藥正先治發後治風之妙自後人或

謂不當無入白朮不知白芷香而不燥正和榮衛之藥藥也方合而

方用人參白朮陳皮甘草茯苓川芎厚朴枳椇梗麻黃白芷更加葛根治

風則未是也何也四君子補脾胃藥更加白芷去手陽月經氣多藥自腎

胃間氣陳皮理脾氣背皮滯肝氣若風果在于手陽助脾胃腎而氣

降氣

蘇子降氣湯方

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘促血

降氣

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘促血

降氣

五

調中
順氣

或大便不利加為氣王麻虛火盛故氣高痰湧或喘或嘔甚則嘔血也
而愈不通或暫通復秘因而下血者亦常服氣順則自通當求溫緩之劑

蘇子 半夏 前胡 厚朴 枳實 橘紅 當歸 甘草 肉桂 分 加

煎一方無桂有沉香沉香能升降諸氣溫而不燥

此手太陰藥也蘇子前胡厚朴橘紅半夏皆能降逆上之氣兼能除痰

氣行則痰行也數藥亦能發表既以疎內兼以散外寒也風痰壅盛

當歸潤以和血甘草甘以緩中下虛上盛故又用官桂引火歸元也機

散義曰此散鬱和中之劑華羅曰凡外出血皆由上盛下虛有升無降

血隨氣升法當先順其氣氣降則血歸經矣宜蘇子降氣湯加人參阿膠各一錢下養正丹昂按方內多被氣發表之藥又有牛

夏肉桂血藥亦當審用養正丹金石克疎而成尤覺非宜

木香順氣湯治陰陽垂滯氣不宜通胸膈痞悶腹脹滿大便不利
也胸膈痞悶者脾胃受傷中氣不通不能升降氣滯於胸也腹脹滿者肝火盛也大便秘者清陽不升故也

七情
氣逆

木香 草蔻仁炒 藟智 蒼朮分厚朴分 青皮 陳皮 半夏 吳茱

萸湯 乾薑 茯苓 澤瀉分二升 麻 柴胡分當歸分

此足太陰陽明藥也木香厚朴青皮陳皮辛能行氣兼能平肝草蔻藟
智香能舒脾蒼朮半夏燥能勝濕乾薑吳茱溫能散寒升柴之輕以升
其陽蒼瀉之淡以泄其陰藟脾為中樞使中樞運轉則清升濁降上下
宣通而陰陽得位矣然皆氣藥恐其過燥故重用當歸以濡其血共成
益脾消脹之功也

四磨湯氏 治七情氣逆上氣喘急妨悶不食然則氣上思則氣結憂恐
不己氣逆厥逆重則長計

急滿妨食

檳榔 沉香 烏藥 人參 等分濃磨煎三四沸溫服一方人參易

枳殼一方去人參加枳實木香白酒磨服名五磨飲子治暴怒卒死名

曰氣厥

此手太陰藥也氣上宜降之故用檳榔沉香檳榔性如鐵石沉香入水則沉故皆下氣

逆宜順之故用烏藥加人參者降中有升瀉中帶補恐傷其氣也大黃

者仍宜枳殼

越鞠丸治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不消
六鬱氣鬱血鬱痰鬱火鬱濕鬱食鬱

也六者之中以氣為主氣行則鬱散矣吞酸嘔吐由于疾火飲食不消

由氣不運行月換日氣升則食自降六鬱不言風寒者風寒者不為

此清血仁日鬱者所以得代去常而病見矣氣鬱者胸膈痞悶者皆

變化者不得變化所以得代去常而病見矣氣鬱者胸膈痞悶者皆

身痛或開節痛遇冷則痛者此氣鬱者胸膈痞悶者皆

便赤脈沉數而滑者此氣鬱者胸膈痞悶者皆

盛○越日木鬱者胸膈痞悶者皆

上鬱者之金鬱者胸膈痞悶者皆

香附神效蒼朮神效撫芎神效神效神效神效神效

茯苓白芷火鬱加青黛痰鬱加南星半夏枯蕒海石血鬱加桃仁紅花

號名
什頂

氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山查砂仁挾寒加吳茱萸又或春加防
風夏加苦參冬加吳茱萸經所謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之
也

此手足太陰手少陽藥也吳鶴皋白越鞠者發越鞠鬱之謂也香附開

氣鬱蒼朮燥濕鬱撫芎調血鬱梔子解火鬱神麴消食鬱陳來草曰皆

理氣也氣暢而鬱舒矣來丹溪曰鬱為燥滯燥乃陽明積金之位肺

曰諸氣賦鬱皆屬于肺又鬱病多在中焦中焦脾胃也水穀之海五藏

六府之主四藏一有不平則中氣不得其和而先鬱矣此方藥兼并降

者將欲升之必先降之將欲降之必先升之蒼朮辛烈雄壯固胃強脾

能徑入諸經疎泄陽明之濕通行欬滯香附陰中快氣之藥不氣最速

一升一降故鬱散而不熱芎足厥陰藥直達三焦上行頭目下行血海

為通陰陽血氣之使不但開中焦而已胃主行氣于三陽脾主行氣于

三陰脾胃既布水穀之氣得行則陰陽藏府不受燥金之鬱皆由胃氣

而得通利矣○或問再溪曰脈訣云熱則生氣冷則生氣皆于列仲景

之言而尸其非然則諸氣諸飲嘔吐吞酸反胃諸病將無寒症耶曰五

藏各有大五志藏之其火隨起若諸寒為病必須身犯寒氣口食寒物

七氣
消痰

非若諸火病自內作所
以氣病者十無一二

七氣湯

三因方亦
名四七湯

治七情氣鬱痰涎結聚咯不出嘔不下胸滿喘急或

咳或嘔或攻衝作痛

七氣者寒熱喜怒憂愁悲也七情之病令人氣結痰聚陰陽不得升降故有痞滿喘咳衝痛等症

半夏

薑汁炒
五錢

厚朴

薑汁炒
三錢

茯苓

四錢
紫蘇二錢

加薑棗煎

此手足太陰藥也氣鬱則痰聚故散鬱必以行氣化痰為先半夏辛溫除痰開鬱厚朴苦溫降氣散滿紫蘇辛溫寬中暢肺定喘消痰茯苓甘淡滲濕益脾通心交腎痰去氣行則結散鬱解而諸症平矣

本方加白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯 治七情鬱結陰陽反戾吐

利交作寒熱眩運痞滿噎塞

四七湯

局方亦名
七氣湯

治七情氣鬱痰涎結聚虛冷上氣或心腹絞痛或膨

脹喘急

針經云胃絡不和喘出于腎氣之上并
逆真元耗散喘出于腎氣之上并

溫中
解鬱

人參 官桂 半夏 甘草 加薑煎心腹痛加延胡索能行血中

血

此手太陰藥也李士材曰夫七情過極皆傷其氣丹溪以越鞠丸主之而此獨異者蓋鬱久則濁氣閉塞而清氣日薄矣故雖痛雖膨而不用木香枳殼用人參以壯主氣之藏肺官桂以制謀慮之鬱肝者將軍之鬱久肝火必鬱久生痰半夏為之驅逐鬱故不和國老為之調停甘桂性辛溫疎氣甚捷鬱結者還為和暢矣湯名四七者以四味治七情也玉機微義曰經云寒則氣收宜辛散之甘緩之此治氣虛寒鬱藥也

痞氣

代瀕旋覆湯仲景治傷寒發汗若吐若下解後心不痞鞭噫氣不除下後

大邪雖解胃氣弱而不和虛血上逆故痞鞭噫氣即俗所謂受氣也

旋覆花三兩代瀕石兩人參二兩甘草三兩半夏半升生薑五兩大棗十二枚

代瀕石一名石

此足陽明藥也成氏曰嘔則氣堅旋覆之鹹以吳茱萸怯則氣浮代赭

之重以鎮虛逆代赭色赤體重又辛者散也生薑之辛以散虛痞甘者

緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱補目云病後虛弱噫氣不下利

人云有旋覆代赭症或咳逆氣虛者先服四逆湯胃氣逆者先服理中湯後服此湯為良周揚俊曰子每借之以治反胃噎食氣逆不降者神効

丁香柿蒂湯氏治久病呃逆因下寒者按方書無呃字或作欬逆或作

噦氣帶也海藏東垣皆以噦為乾嘔人多非之今從俗作呃逆此病有因痰且氣滯者有因血瘀者有因火鬱者有因胃熱失下者此皆屬實

有因中氣大虛者有因大下胃虛陰火上衝者此皆屬虛虛實治法不一古方以此湯治寒呃雖病本于寒然亦有火也○呃在中焦數

氣不運其聲短小得食即發呃在下焦真氣不足其聲長大不食亦然

丁香 柿蒂 錢二 人參 錢一 生薑 片五 一方加陳皮半夏茯苓甘草良薑

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而煖腎生薑去痰開鬱而散寒柿

蒂苦澁而降氣人參所以輔真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治

之法也以熱攻熱名曰從治朱丹溪曰人之陰氣附胃為其土氣則木
能清利無唯助火而已李時珍曰宋氏僅執以與治熱藥多有收功者
按古人治陰虛每用桂附乾薑大藥下香苗香諸手熱藥多有收功者
治陽虛用補紅竹茹湯玉散散散白散連本山陰氣已虛陽火果甚正
對而上出于胃人于肺而作聲真想用涼藥者所以為熱降火也若陰
虛免運以陰氣先消動火亦竭浮于中亦欲微也故不用寒藥而反
以溫藥養胃其動火消氣一和動生則陰長之說也或問治陽虛者
何以不用知補其動火消氣一和動生則陰長之說也或問治陽虛者
神者生之者知補其動火消氣一和動生則陰長之說也或問治陽虛者
 矣

本方除人參生薑亦名丁香柿蒂湯原氏治同本方除人參生薑加竹茹
 橘紅名丁香柿蒂竹茹湯又名橘紅竹茹湯實鑑去人參加青皮陳皮
 三因去人參加真蘇甘草名丁香治同

喘逆
 喘逆

橘皮竹茹湯 治久病虛喘逆不已胃寒則喘逆并喘有停痰有積
飲皆作喘此為久病虛火上逆而

乾嘔 亦治吐利後胸虛呃逆

乾嘔 亦治吐利後胸虛呃逆

橘皮 竹茹 人參 甘草 半夏 麥冬 赤茯苓 枇杷葉 加
錢斑煎胃寒者去竹茹麥冬加丁香實火去人參

此足陽明藥也胃火上衝肝膽之火助之肺金之氣不得不降故嘔竹
茹枇杷葉麥門冬皆能清肺而和胃肺金清則肝氣亦平矣肝木扶相
故作呢金 二陳所以散逆氣陳皮半夏赤茯苓所以降心火生薑嘔家之聖

藥久病虛羸故以人參甘草大棗扶其胃氣也

金匱橘皮竹茹湯橘皮升三竹茹升二人參一甘草五生薑半大棗三十治

噦逆即此方而如半夏麥冬赤茯苓枇杷葉

定喘湯

治肺虛感寒氣逆喘熱而作喘喘有聲因之痰外有非時之

陽氣伏于胸中不得津越後喘熱氣逆喘有聲因之痰外有非時之

白萊三十一麻黃 半夏 款冬花 桑白皮 蘇子 杏仁 黃

冬甘草一 加糖煎

此手太陰藥也表寒宜散麻黃杏仁桑白甘草辛甘發散瀉肺而解表
裏虛宜飲然冬溫潤白朮收澀定喘而消金蘇子降肺氣黃芩清肺熱
半夏燥痰相助為理以成散寒疎壅之功

想血之劑人身之中氣為衛血為營經曰營者水穀之精也調和五
于肝宜布于肺氣能于六府乃能入于肝也生化于脾總統于心奉受
乎母之而能攝持之而能通足得之而能步氣得之而能液府得
之而能氣出入升降通注之于肝充則實少則濡生旺則諸經皆
長取汁變化而升為血也注之于肝充則實少則濡生旺則諸經皆
此長養要竭則百脈而此空虛血虛則形骸血弱則形骸血者難成
而多虧可不謀乎陰氣一傷諸變立至妄行于上則吐衄妄行于
下則腸風發洩于內則虛勞枯槁于外則消渴移熱膀胱則溺血
虛陽搏則崩中濕熱無形則血病大極似木則色黑熱勝于陰發為
瘡瘍濕滯于血則為癰疹凝滯于皮膚則為疥癩蓄血在上則善思
省血在下則如狂跌仆損傷則于惡內聚此皆失于調養變為諸病
也

血虛

四物湯

治一切血虛及婦人經病

從陽改其色紅上應于月其行有常故名曰經為氣之配而血之行成也
 也諸經妻行有氣之亂者氣之滯行後作痛者氣血俱虛也色淡亦能
 成塊學指為風冷乘之而川溫熱之劑則不脫矣經曰九則客承乃
 則熱甚則寒小化所以然則其則熱也若曰風冷必頻外得設或有
 之十不一二也玉機微義曰寒則凝而不行既行而紫黑故知非寒也
 當歸洗生地黃三芍藥二芩莖凡血虛通宜四物湯如涼血心加
 黃連用條芩肺枯芩大腸實芩膽黃連腎勝胱黃柏脾生地司大黃三
 焦地骨皮心胞絡丹皮小腸山梔木通如清氣心與胞絡加麥冬肺積
 殺肝柴胡青皮脾白芍同乾薑石膏大腸三焦連翹小腸赤茯苓膀胱
 滑石琥珀血虛如癰板血燥加人乳蜜血加桃仁紅花非汁重便行之
 然血加荷荷玄參散之血不止加炒黃芩京黑久不止加麻麻引血歸
 經婦人經血紫黑脈數為熱加芩連血淡脈遲為寒加桂附人肥有痰

血海
紅血

加半夏南星橘紅人瘦有火加黑梔知母黃柏鬱者加木香砂仁蒼朮
神麴瘀滯加桃仁紅花延胡肉桂氣虛加參耆氣實加枳朴
此手太陰足太陰厥陰藥也血心生血肝藏血當歸辛甘溫入心脾生血
為君生地甘寒入心腎滋血為臣芍藥酸寒入肝脾飲陰為佐芍藥辛
溫通上下而行血中之氣為使也行血海玉機微義曰川芎上行頭目下
藥也通肝經性味辛散能行血滯于氣也地黃血中血藥也通腎經性
味甘寒能生真陰之虛也當歸血中血藥也通脾經性味辛散能行血
全月活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能行血
虛腹痛也此特血病而求血藥之屬者也若氣虛血弱又當從長沙血
虛以人參補之陽明即能生陰血也輔佐之屬者桃仁紅花蘇木丹皮
血竭者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者血崩所宜茯苓
陽牛膝拘杞龜板夏枯草並以草者而虛所宜滋桂血寒所宜苦參生地汁
花者血痛所宜乳酪血液之物血燥所宜滋桂血寒所宜滋桂血熱于血藥
血熱所宜荷能潤顏而長可應無窮之變矣丹法治陰虛發熱于血藥
四物湯亦分陰陽血之動者為陽芍歸坐之血之靜者為陰地芍主之
血之陰不尤難芍歸辛溫亦不用血之陽不足難滋桂辛熱亦用之與
瀉火之決正治從治相河吳鶴皋曰大地之道陽常有餘陰常不足人

身功雖敗血者難成而易虧夫草木無情安能生血以地芍能養五臟
之陰芍歸能調營中之氣陰陽調和而血自生而若夫失血太多氣息
幾絕之際與勿與之益四物陰類非所以生動者也當重用參當以固
欲絕之氣故曰脫血者先補其氣否則川芎香鼠反能耗氣血變亡
而元失故凡虛損胃藥乎一陽子曰四物湯隱于脾胃治法人味久在
藥于內亦有脾胃藥乎一陽子曰四物湯隱于脾胃治法人味久在
經少血多氣當歸地黃生血滋潤脾經土畏賊和木來尅上木藥能腐
木補脾肝欲散用川芎之辛以散之非制木補土脾胃之藥乎或曰庄
後禁用芍藥否曰新產血氣未平恐芍藥酸收作痛耳芍藥尚能活血
氣痛新產正血氣虛痛之時醇酒微炒用之何害又血塊瘀滯作痛不
可泥下產後大補氣血一請致積血而瘀者多矣○附子和玉燭散歸尾
只因產後大補氣血一請致積血而瘀者多矣○附子和玉燭散歸尾
生地川芎赤芍大黃芒硝甘草治經閉腹痛
度薄飢取劑雅四時和氣謂之玉燭之義也

本方加黃柏知母名知柏四物湯再加玄參名滋陰降火湯治陰虛有

火知柏四物蜜丸名坎離丸治陰虛嗽血丹溪論勞瘵主乎陰虛蓋自

陰虛則熱在午後子前將屆陽舉為一陰虛則盜汗從睡時出并腰陽
降屬陰陰虛則氣不降痰涎上逆吐出不絕悸浮屬陽陽沉屬陰地則
浮之洪大沉之空虛宜用四物竹瀝加炒柏龜板補陰降火之劑又須
遠情慾薄滋味靜心調養以助之準經云丹淡瀉勞瘵生乎陰虛用四

物加知柏主之世醫通用百無一効何哉蓋陰虛火必上炎為肺辛溫
非滋虛降火之藥川芎上冠非虛炎短之者所宜也黃泥隔非日弱痰
多食少者所宜知柏辛苦大寒雖曰滋陰其實燥血雖曰降火久而增
氣反能助火至其取胃所不待言不若用黃仁百合天冬麥冬桑皮地
骨丹皮酸棗五味子此肥藥之類佐以生地汁藕汁人乳童便等外咳
嗽則多用桑皮枇杷肥藥有痰增貝母有血增黃仁百合門膠熟甚增地
骨食少增黃仁至七八錢而寒冬當為之主以保肺金而滋化源無不
神効又曰虛勞之疾百脉空虚非枯滯之物填之不能實也精血枯
非滿潤之物滋之不能潤也當用參耆地黃二冬枸杞五味之類各煎
又另用青蒿以重便熱膏合前諸汁併藥煎服天膏化飲大抵黃仁
百合之屬治肺虛參耆地黃膏之屬治腎虛益心肝屬
陽神腎屬陰故補肺腎即是補陰非知柏四物之謂也

本方加黃連胡黃連名二連四物湯元治虛勞血虛五心煩熱熱入血

室夜分發熱血空衛弱也夜熱陽弱陰名熱入血海本方加黃柏黃芩甘草名三

黃四物湯治陰虛潮熱本方用生熟二地加黃耆丹皮升麻柴胡三名

黃補血湯治亡血血虛六脉俱大按之空虛二地補血丹皮涼血黃耆

生血陽生則陰自生也本方加桃仁紅花名元戎四物湯治藏結便秘撲損瘀血

陰自生也

本方加羌活防風秦艽名治風六合湯治風虛眩暈風秘便難蜜丸名

補肝丸肝以清為補也本方加木香檳榔名治氣六合湯治血虛氣滯或血氣

上衝本方加羌活天麻蜜丸名神應養真丹治足厥陰經受風寒濕

痺痿不遂語言蹇澁及血虛脚氣本方加桃仁紅花竹瀝薑汁治半升

不遂在左者屬瘀血瘀血不去則新血不生故用桃仁紅花活本方去

白芍加防風名防風膏歸散治發汗過多而成痙症宜去風養血本方

去地黃加乾薑名四神湯治婦人血虛心腹病痛病音痛又音本方加

阿膠艾葉甘草名膠艾湯治衝任虛損經水淋瀝及血虛下痢列見經

本方加艾葉四製香附重便益水酒醋丸名艾附煖宮丸治子宮虛冷

再加阿膠名富貴丹治虛寒經水下調本方加丹皮地骨治婦人骨蒸

本方除芍藥地黃名芎歸湯為末名佛一散又名一奇散又名君臣散

治產後血虛頭痛胎動下血服此自安子死腹中服此即下催生神効

本方合四君子名八珍湯治心肺虛損氣血兩虛四君補氣再加黃耆

肉桂名十全大補湯兼助陽固衛王海藏曰桂枝甘草小建中也加黃

芎歸芍地四物也以氣血俱衰陰陽虛弱法天地之成數故曰十全散十全湯去白芍加山茱五味防風

從美入薑棗煎名大補黃耆湯黃耆治氣血兩虛自汗不止黃耆畏防風

汗及陽虛發厥四物四君合小柴胡名三合散河間治產後日久虛勞本

方四物各七錢加防風一兩梔子黃芩黃連各三錢每服五錢如脉實

加大黃名生地黃耆湯海藏治婦人血風症去血過多因而燥個循衣摸

床撮空閉目揚手擲足錯語失神脉弦浮而虛男子去血過多亦有此

藥也自外而之內者用之生地黃連湯血藥也目內而之外者用之氣

血合前循衣摸床症同目氣之血血而復之氣者大承氣湯下之自血

之氣氣而復之血者生地黃心湯主之二者俱不大便是承氣湯對

子又與三黃石膏湯相表裏是皆三焦包絡虛火之病也病既危急只

補血

當歸補血湯

治傷于勞役肌熱面赤煩渴引飲脉大而虛

得以此此血中之伏火耳○綱目曰四物與桂枝麻黃白虎柴胡
理中四逆散承氣涼膈等皆可作各半湯此易老用藥大畧也
身熱此以飢飽勞役傷其陰血虛陽獨勝故飢熱煩渴與陽明白虎症
無異但自虎症得之外感實熱內盛故脉大而長按之有力此逆得之
內傷血虛發熱脉洪大而無力內經所謂脉虛血虛是也誤服白虎湯必斃

黃者多一兩當歸酒洗二錢空心服

此足太陰厥陰藥也當歸氣味俱厚為陰中之陰故能滋陰養血黃者
乃補氣之藥何以五倍于當歸而又云補血湯乎蓋有形之血生于無
形之氣又有當歸為引則從之而生血矣經曰陽生則陰長此其義耳
初菴曰病本于勞役不獨傷血而亦傷氣故以二藥兼補之也

引血
歸脾

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾怔忡健忘驚悸盜汗發熱體倦食少

不眠或脾虛不能攝血致血妄行及婦人經帶心驚神而主血心傷則不能生血而血少故怔

脾健主肌肉故脾主四肢脾放體健脾不健運收食少脾不能執
血則妄行而有吐衄風崩漏等症○
動日停即怔忡也上氣不足下氣有
人參 白朮 茯苓 龍眼肉 錢黃者 當歸 遠志 木

香 甘草 分 薑棗煎

此手少陰足太陰藥也血不歸脾則妄行參朮黃者甘草之甘溫所以

補脾扶神遠志棗仁龍眼之甘溫酸苦所以補心遠志苦泄心熱心者

脾之母也當歸滋陰而養血木香行氣而舒脾既以行血中之滯又以

助參耆而補氣汪机曰木香與補藥為佐氣壯則能攝血血自歸經而

諸病悉除矣正為先氣壯則自能攝血醫貫曰心主血肺親血肝藏血

凡治血症須滋三經用藥遠心廣仁補肝以生心火夜神補心以生

養心湯 治心虛血少神氣不寧怔忡驚悸心主血而藏神經曰靜則神

補心 血

收口神效
不得安寧也

黃耆

扶神

當歸

川芎

半夏

甘草

酸棗仁

遠志

五味子

人參

肉桂

每服五錢

此手少陰藥也人參黃耆以補心氣川芎當歸以養心血二伏遠志柏

仁酸棗以泄心熱而寧心神五味收神氣之倏越半夏去擾心之痰涎

甘草補土以培心子赤桂引藥以入心經潤以滋之溫以補之酸以斂

之香以舒之則心得其養矣

人參養榮湯 治脾肺氣虛榮血不足驚悸健忘癯瘠發熱食少無味身

倦肌瘦色枯氣短毛髮脫落小便赤澀

下輪勝於此天氣下降也脾肺經則土不交而為不榮血少則心失其養故

驚悸健忘癯瘠發熱肺主皮毛脾主肌亦治發汗過多身振脈搖筋惕

肉血虛火盛故肌瘦色枯毛髮脫落也

肉潤汗為心液汗即血也發汗過多則血脫枯

人參 白朮 黃耆黃耆黃耆甘草炙陳皮桂心當歸 熟地黃 五

味子味子炒 茯苓分七 遠志分五 白芍分五 加蔥煎

此手少陰手足太陰氣血藥也熟地歸芍養血之品參耆朮甘草陳

皮補氣之品血不足而補其氣此陽生則陰長之義且參耆五味所以

補肺肺主氣氣能生血 甘陳苓朮 所以健脾脾統血 歸芍所以養肝肝藏血 熟地所

以滋腎腎藏精精血相生 遠志能通腎氣上達于心桂心能導諸藥入營生血

五藏五藏之藥 故能統治諸病而其要則歸于養榮也薛立齋曰氣血

症真能名狀勿論其病勿論其脈俱用此湯諸症悉退兩處而安以諸

是補肺氣肝自能生血即此便是養榮便是補心補肺理實一貫古方

補血補血黃耆五倍於當歸而云補血豈非名證乎 况五藏互相灌輸傳

哉又按生脈散保肺榮也而云生脈者脈即血也

情熱
理血

龍腦雞蘇丸

治肺有鬱熱咳嗽吐血動血下血熱淋消渴口臭口苦

清心明目

肺有鬱熱咳嗽其則通血上行故吐動肺移熱於大腸則下血肺熱則肺虛其化源故肺悶肺熱則渴而多飲為上

消渴胃有熱則口臭肝熱有熱則口臭

雞蘇葉

一名龍腦薄荷一兩六錢生地黄六錢麥冬四錢蒲黃炒阿膠炒木通銀柴胡

二甘草

半錢黃耆人參一錢先將木通柴胡浸二日熬汁地黄浸汁熬

膏再加蜜三兩煉過和九梧子大每服二十九細嚼湯下一方有黃連

此手足太陰少陽藥也肺本清肅或受心之邪熱或受肝之亢害故見

諸症薄荷辛涼輕揚升發瀉肺搜肝散熱理血故以為君生地黃涼血

炒蒲黃止血以療諸血柴胡平肝解肌熱木通利水降心火麥冬阿膠

潤燥清肺參耆甘草瀉火和脾此亦為熱而涉虛者設故少佐參耆也

喻嘉言曰此丸兩解氣分血分之熱宜常服之

咳血方

治咳嗽痰血

切也肺爲華蓋至清之藏有大則咳有痰則嗽

肺主氣氣逆爲咳附主水水泛爲痰腎上入肺傷其支者從肺
絡心屬胸中故病則俱病矣逆唾中少血散漫者此腎火炎上
之血也若血如紅縷從痰中咳出者此脈絡受熱傷之血也若咳出自
血淡紅色似肉似肺者必死○凡壅中帶血咯出有血或如絲爲腎
鼻動出血咳嗽有血屬肺經咳吐血成盆成碗者屬胃經陽明多血多氣
故也日兩脇逆上吐血者屬肝經逆血爲小腸膀胱經下血屬大腸逆
牙宣出血屬胃腎虛火古血謂之舌衄汗孔出血謂之肌衄心與肝也
又散而動血者屬心怒而動血者屬肝憂而動血者屬脾思而動血者
屬脾勞而動血者屬腎

尚氣水栢葉仁

海右

炒山桅炒訶子肉

等分爲末蜜丸嚙化嗽甚

加杏仁

此手太陰藥也肝者將軍之官肝火上逆能燥心肺故咳嗽痰血也青

黛瀉肝而理血散五藏鬱火梔子涼心而清肺使邪熱下行二者所以

治火枯痿潤燥滑痰爲治嗽要藥

能清上焦痰火
傷除鬱熱垢膩

海石軟堅止嗽清水

張



1

五、

10

1

肺癆
咯血

之上源

止肺為水之上源

二者降火而兼行痰加訶子者以能飲肺

而定痰喘也不用治血之藥者火退則血自止也

獨聖散

治多年咳嗽肺癆咯血紅

白芨

為末每服二錢臨卧糯米湯下

此平太陰藥也人之五藏惟肺葉燥爛者可以復生白芨苦辛收澁得

秋金之令能補肺止血故治肺損紅痰又能蝕敗疽死肌為去腐生新

之聖藥

台州縣史一重因威之云晉七犯死罪遭刑拷肺皆傷損得一方用白芨末末飲日服其效如神後日復還剖其胸見肺

間竅穴數十皆自芨填補色滿不變也

清咽太平丸

治膈上有火早間咯血而頻常赤咽喉不清肺為金肅情

燒灼肺金受刑故咯血早間寅卯木旺生火之時兩煩肺用之部也十

二經肺惟足太陰在表不歷屬咽皆上肺喉嚨能作病而君相二火為尤甚諸火上逆故咽喉不常

薄荷十兩 防風 犀角 柿霜 甘草二兩 桔梗三兩 蜜丸

此手太陰藥也薄荷辛香升浮消風散熱消風故疎肝散熱故防風血

藥之使瀉肺搜肝防風瀉肺火散用大川芎血中氣藥升清散瘀清升

降為通陰陽柿霜生津潤肺犀角涼心清肝甘草煖炎上之火勢桔梗

載諸藥而上浮又甘桔相合為清咽利膈之上劑也

火嗽

還元水飲自己渴治咳血吐血及產後血運陰虛久嗽火蒸如燎血生

統于脾藏于肝宜布于肺靜則歸經熱則妄行火傷肺絡血隨咳出或

帶痰中為咳血吐血多者為吐血產後去血過多則發運肺主皮毛故

童便取十一二歲無病童子不茹葷辛清徹如水者去頭尾熱飲冬

則用湯溫之或加藕汁阿膠和服有痰加薑汁

此手太陰足少陰藥也童便鹹寒降火滋陰潤肺散瘀故治血症火嗽

醫方集解卷之六

內虛
外感
吐血

血運如神北齊褚澄曰喉不容物毫髮必咳血既滲入愈滲愈咳愈咳
性溫不寒飲之入胃隨脾之氣上歸于肺下通水道而入膀胱乃其舊
路故能治肺病引火下行其味鹹而走血故治血病當熱飲熱則真氣
尚存其行自速冷則惟有鹹寒之性而已李士
材曰煉成秋石真元之氣漸失不及童便遠矣

麻黃人參芍藥湯

東垣

治吐血外感寒邪內虛蘊熱

東垣常治一貧上病

網居曠室臥熱炕裏而吐血東垣謂此久虛弱冬居曠室衣服單薄是
重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於目當補表之
陽渴裏之虛熱因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不
與之遂成動血却與麻黃湯立愈與此甚同因作此湯一服而愈

桂枝

五分補

麻黃

去外

黃耆

實表

甘草

炙補

白芍

安太陰

人參

益元氣

麥冬

保肺氣

五味子

五粒安

當歸

血養血

熱服

各三分

此足太陽手足太陰藥也綱目曰觀此一方足以為萬世模範矣蘇取

仲景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人當服仲景方者當以此為則

也

盧府胃也 在經肺也 裏熱也 熱大也 賜也

張

犀角地黄湯

治傷寒胃火熱盛吐血衄血嗽血便血畜血如狂嗽水

不欲嘔及陽毒發斑

口血曰吐血鼻血曰衄血行濁道動行清道卿與咽

火氣急延故隨經直犯清道上腦而出於鼻為衄其從肺竅而出于咽

者則為咳血咯血其存胃中者為守營之血守而不走胃虛不能附血

或為火逼故嘔吐從喉而出也吐血之熱在府動血之熱在經雜病動

血為裏熱傷寒動血為表熱經曰心後熱於肺則咳嗽出血便血有寒

熱二症傷寒便血為傳經熱邪瘀血在上焦則善忘在下焦則如狂嗽

水不欲嘔熱在經未入裏也畜血發躁而內不渴故雖嗽水而不欲嘔

海藏曰大凡血症皆不欲水淮氣症則飲水經曰陽明病口燥嗽水不

欲嘔者其傷血裏實表虛發汗而不發汗邪熱人裏通血忘行故見諸症

疹者熱其傷血裏實表虛發汗而皮膚而為斑疹傷寒下早熱毒乘虛入

胃則發斑下遲熱留胃中亦發斑或服多熱藥亦發斑見紅紅者為疹

如錦紋者為斑疹輕而斑重色紫黑者熱極而胃爛也多紅紅者為疹

真不可汗汗之重合開泄更增斑瀾亦不可遽下恐斑毒內陷也

生地黃

半兩

白芍

兩

丹皮

犀角

二錢

半角

尖元

良鹿

取茸

犀取

尖其

精

堪

堪

堪

堪

堪

堪

堪

堪

堪

堪

堪

堪

堪

堪

堪

入藥 每服五錢熱甚如狂者加黃芩一兩因怒致血者加梔子柴胡

湯二升二焦之火梔子湯三焦 節菴加當歸紅花桔梗陳皮甘草藕汁

之火柴胡平少陽厥陰之火 參芍湯 犀角

名加味犀角地黄湯以治同

當歸引血歸經藕汁涼血散瘀桔梗以利上焦陳皮以導中焦紅花以行下焦

此足陽明太陰藥也血屬陰本靜因諸經火逼遂不安其位而妄行犀

角太寒解胃熱而清心火芍藥酸寒和陰血而瀉肝火

肝者心之母

丹皮苦

寒瀉血中之伏火主地大寒涼血而滋水以其平諸經之僭逆也

海藏曰血

分三部藥有重輕犀角地黃湯治上血如吐衄之類桃仁水氣湯治中血如血育中焦下痢膿血之類抵當湯治死勿血如畜血如狂之類又曰此症足太陰所主脾不理血越而上行實者犀角地黃湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐血者成用芍藥主之故知太陰藥也醫黃曰犀角地黃湯乃動血之方蓋犀角能下人腎水引地黃滋陰之品由腎脉而腎而至巔頂入鼻中惟犀角能下人腎水引地黃滋陰之品由腎脉而胃處者皆所不宜○傷寒汗出不微能通動經血誤發其汗亦動經血二考不同胸上支治一入傷寒四五日吐血不止晝以犀角地黃湯茅花湯治之反劇胸切其脉浮數而緊遂而麻黃湯汗出而愈此取脉不取症也可謂得仲景心法矣使脉不浮而數其可用乎經曰傷寒脉浮榮不發汗因致衄者麻黃湯主之又曰太陽病脉浮榮發熱身無注自汗者愈風寒在經鬱而為熱不得汗解則熱隨血散俗名紅汗故愈者全未發汗致衄者仍須用麻黃發之成無已曰傷寒衄者為邪氣

太陽膀胱府也
通而下降
蓄血

桃仁承氣湯

治傷寒外症不解熱結膀胱小便脹滿大便黑小便利

不得發散熱盛于經過迫于血也程枝府黃湯治動者非治動也即是
發散經中邪氣耳血鬱于上而吐血奇謂之薄厥留于下而痰者謂之
畜血此由太陽隨經瘀熱在裏血為熱所搏結于下焦少腹當硬小便
自利未眩活人書言瘀血入裏吐衄動者屏角地黃湯乃陽明聖藥始
無屏角代以升麻二藥性味相違何以為代蓋以升麻能引諸藥同入
陽明也朱二允曰升麻性升屏角性降用屏角止血乃借其下降之氣
清心肝之火使血下行歸經耳倘誤用升麻血隨
氣升不愈湧出不止平故古方亦未可盡泥也

燥渴譫語畜血發熱如狂及血瘀胃痛腹痛脇痛瘧疾發熱夜發痢疾

畜血急痛隨熱邪自太陽不解傳入膀胱之經與血相搏若血自下則熱
便黑者血瘀也小便便利者血病而氣不病也小便不利而小腹仍急故知
為畜血心主血邪熱上于心若不早故疎煩譫語而如狂瘀血聚於陽

明則胃痛在太陰則腹痛在厥陰則脇痛夜發者熱入血分也活人
云不當汗而汗之亡其津液陽擾之極則發陰也故燥血畜于胸中也

李挺曰太陽症則如狂陽明症則善忘少陽症則寒熱如瘧傷寒有用
大小湯不解反便堅者食者瘀血也○凡胸中滿心下滿者皆氣也腹

中滿者或燥夫或宿食小腹痛者或滿或血停畜而腹滿也清陽出主
痰故上滿者為氣而非物濁陰出下數故下滿者為物而非氣俱是熱

痰故上滿者為氣而非物濁陰出下數故下滿者為物而非氣俱是熱

痰故上滿者為氣而非物濁陰出下數故下滿者為物而非氣俱是熱

治
仁
號
生
學

厥冷為可辨昂按痰滿亦有在上焦者

桃仁五十枚取大黃兩芒硝甘草桂枝一兩

此足太陽藥也大黃芒硝蕩熱去實甘草和胃緩中此調胃承氣湯也

熱甚搏血血聚則肝燥故加桃仁之苦甘以潤燥而緩肝加桂枝之辛

熱以調營而解外直達瘀所而行之也桂枝湯曰桂枝輕揚上行此當是

達血所加桂枝以解外邪亦猶大柴胡湯用柴胡解外和勢益見太陽

隨經之邪非桂枝不解耳昂按傷寒與雜病不同仲景之書端為傷寒

而設故當用桂枝解外而五苓散與桃仁承氣均為太陽犯府之藥一

利前而主氣分一利後而主血分治各不同據聖生曰血溢血泄諸畜

或問失血後不虛何以當蘇伊舉曰血既妄行迷失故道不去畜利瘀

則以妄為常何以藥之此去者白去主者自生何虛之有
本方加青皮枳實當歸芍藥蘇木汁柴胡名桃仁承氣對一節菴加清
破血必行氣也加當歸芍藥去瘀而生新也柴胡
平肝升清而散表熱蘇木助桃仁桂枝以逐瘀血

下焦

抵當湯

治太陽病六七日表症仍在脉微而沉反不結胸其人發狂

者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者必有畜血令人善忘所以然

者以太陽隨經瘀熱在裏故也表症仍在謂發熱惡寒頭痛煩躁未罷也太陽為經膀胱為府此太陽熱邪隨

經人府熱與血搏故為畜血脉沉為在裏表症仍在則邪氣猶淺不結于胸中而發狂經曰熱結膀胱其人如狂又曰血併于下亂而善忘少

腹鞭滿而小便不利者為溺瀦鞭滿而小便利者為畜血準繩曰玩仍在二字則邪氣為不傳裏非猶淺也膀胱為太陽本經曰熱結下焦曰

少腹鞭滿曰小便自利皆膀胱之症故總結曰隨經瘀熱也在裏二字乃隨經膀胱之裏非三陰之裏也按太陽在陽在表即有沉緊沉滑之

脉皆不得以裏陰名之

水蛭三十個猪脂熬黑 蠭虫三十個去頭足翅 桃仁二十去皮尖研 大黃四兩酒浸

此足太陽藥也成氏曰苦走血鹹滲血蠭虫水蛭之苦鹹以除畜血甘

緩結苦泄熱桃仁大黃之甘苦以下結熱程郊倩曰表症仍在脉微而

下焦可知非桂枝所能散桃仁承氣所能攻緣熱結膀胱與厥熱在裏邪有淺深故桃仁承氣與抵當湯攻有緩急

本方減水蛭十個竈虫桃仁各減五箇分爲四丸每水煮一丸名抵當

丸治本病無喜忘如犯之症者水蛭即馬蝗蚊咬寒有毒乃食血之虫能通肝經聚血最難死雖火爲未得水

便活苦入腹中生子爲患田泥和水飲下之竈虫即收虫曰其食血故

用以治血二藥險咳世人罕用故更製代抵當湯吳鵠舉曰古人用較

出水蛭治血積以其善吮血耳若天鼠矢乃食蚊而化者也付代抵當

常亦可以治血積本草稱其下死胎則其能攻血塊也何疑

九大黃四兩生地歸尾桃仁穿山甲玄明粉各兩桂枝三錢蜜丸桃仁歸尾生

桂心熱以動之大黃玄明粉若寒鹹寒以推蕩之加穿山甲引之以達于瘀所也

槐花散本治腸風藏毒下血血之在身有陰有陽陽者順氣而行循流

居于絡脉尚守藏府滋養神氣濡潤筋骨若感內外之邪而受傷則或

隨經之陽血至其傷處爲邪氣所沮滯泄經外或居絡之陰血因留著

之邪潰裂而出則皆滲入腸胃而泄矣世俗率以腸風名之不知風乃

六淫之一耳若腸胃受火熱二淫與寒燥濕排其氣及飲食勞力傷

其陰絡之血者亦可謂之腸風乎針經曰陽絡傷則血外溢而吐衄陰

絡傷則血內溢而便溺菀氏以隨感而見色鮮者爲腸風積久而發色

瘀者爲藏毒又云色鮮爲熱自大腸氣分來色瘀爲寒自小腸血分來

或曰腸風者風邪滿胃藏毒者濕邪滿胃○藏毒腸風之血出於腸藏

之間五府之血出于肝
門蝕孔處治各不同

槐花炒側柏葉并荆芥炒枳殼炒等分爲末每服三錢米飲下

此手足陽明藥也側柏養陰燥濕最清血分槐花疎肝瀉熱能涼大腸

荆芥散瘀搜風爲風病血枳殼寬腸利氣此病多由濕熱風燥之邪如

兼溫補及升舉藥大法涼血用槐角地榆蒲柳條芥炒連槐子生地和

血用阿膠當歸川芎白芍風濕用秦九防風荆芥蒼木茯苓血瘀少加

桃仁紅花蘇木寬腸用枳殼升舉用升麻生血補氣加人參黃耆白朮

甘草○柏葉生而向西稟金兌之正氣能制肝木木主升金主降升降

相配夫婦之道和則血得以歸肝故仲景治吐血不止氣血虛寒用柏

葉湯和藥乾薑各三兩艾三把馬糞汁一升合煮服馬糞午爲離假之

以降心火

本方除柏葉荆芥加當歸黃芩防風地榆酒糊丸名槐角丸局治同

疎本方加當歸生地川芎入烏梅生薑煎名加減四物湯濟生治同

風疎本方除柏葉枳殼加當歸川芎熟地白朮青皮升

若以風爲虛象者蓋本方除柏葉枳殼加當歸川芎熟地白朮青皮升

非風客于腸胃故也

血痔 二陰 之交 各箕 燥金 大腸 也

麻亦名槐花散又名當歸和血散東垣治腸澀下血濕毒下血本方除柏

葉枳殼加青皮等分亦名槐花散古治血痢腹不痛不裏急後重單用

槐花荆芥炒黑為末酒服亦治下血方經

秦艽白朮丸

東垣

治痔瘡痔漏有膿血大便燥結痛不可忍手湯明大腸

主收司行津液以從足陽明胃土之化也則生此化萬物人或醉飽入房

酒熱留着忍精不泄流注纂問前陰之氣歸于大腸木乘火勢而侮燥

金大就燥則大便閉而痔作矣受病者燥氣也為病者胃

濕也濕熱風燥四氣合邪法當瀉火潤燥疏風和血止痛

秦艽 白朮 歸尾 桃仁 枳實 皂角子 澤瀉 地榆

麴糊丸

此手足陽明藥也李東垣曰秦艽桃仁歸尾潤燥和血秦艽為風藥中潤劑皂角仁以除風燥地榆以破血止血枳實苦寒以補腎而泄胃實澤瀉淡滲使氣歸于前陰以補清燥受胃之濕邪也清燥謂大腸也白朮之苦以補燥氣

之不足其味甘以瀉火而益元氣故曰甘寒瀉火乃假根實之寒也大便秘瀉以大黃推之其津液益不足用當歸和血加油潤之劑自然更利矣

本方除白朮枳實地榆加蒼朮黃柏大黃檳榔防風名秦荒蒼朮湯治

同李東垣曰腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者兼受火熱也是濕熱風燥四氣合邪當去四者以破氣藥兼之治法全矣本

防除犀角枳實地榆加防風升麻柴胡陳皮大黃黃柏紅花炙草名秦

荒防風湯治痔漏大便時疼痛東垣曰如無痛者非痔漏也本方用秦荒一味加羌

活防風麻黃升麻柴胡蘗本細辛黃耆炙草紅花名秦荒羌活湯治痔

漏成圯下垂不任其癢本方除地榆加大黃紅花名秦荒當歸湯治痔

漏大便秘結疼痛以上皆東方

芍藥湯治下痢膿血稠粘腹痛後重下痢皆屬濕熱赤為傷血白為傷氣膿血稠粘氣血兩傷也腹

血痢

芍藥湯
治下痢膿血稠粘腹痛後重
下痢皆屬濕熱赤為傷血白為傷氣
膿血稠粘氣血兩傷也腹

凡後重氣血皆滯也劉河間曰行血則膿血自愈調氣則後重自除

芍藥兩 歸尾 黃芩 黃連錢五 大黃錢三 木香 檳榔 甘草錢二 桂錢半

每服五錢利不減加大黃

此足太陰手足陽明藥也芍藥酸寒瀉肝火飲陰氣和營衛故以為君
大黃歸尾破積而行血木香檳榔通滯而行氣黃芩黃連燥濕而清熱
蓋下痢由濕熱鬱積于腸胃不得宣通故大便重急小便赤澀也辛以
散之苦以燥之寒以清之甘以調之加肉桂者假其辛熱以為反佐也

對換此方蓋木仲景黃芩湯而加行血調氣之藥

本方除桂甘草加枳殼名道滯湯一作導氣湯治前症兼渴者此方今人多用大法治痢

以甘芍和中止腹痛熱痢加芩連寒痢加姜桂以木香檳榔行氣除後重氣分加枳殼滑石寬腸血分加當歸枳仁和血以秦艽皂子祛腸風黃芩黃連清熱毒以白朮陳皮調胃茯苓澤瀉瀉濕枳實人黃破積嘔吐加石膏薑汁氣虛加黃耆參朮血虛加芍歸阿膠黑薑柏藥痢日後

血痢

重不解去板柳換
條芩加升麻提之

蒼朮地榆湯

治脾經受濕痢疾下血

蒼朮

三兩

地榆

一兩

每一兩煎

此足太陰陽明藥也蒼朮燥濕強脾升陽而開鬱地榆清熱涼血酸收
能斷下為治血痢腸風之平劑初起者勿用

本方加芍藥阿膠卷柏名芍藥地榆湯

治泄痢膿血乃至脫肛

補血與液為脾大
腸要藥能治熱痢

血淋

小便不利

小薊飲子

治下焦結熱而成血

木心主血小腸其府也熱甚搏血流入

小腸滲入膀胱心熱者小腸必熱經所謂胞移熱于膀胱則癰溺血是
也然熱必兼濕戴氏曰血鮮者心小腸實熱血瘀者腎膀胱虛冷準繩
曰多有熱極而面凝黑者不可更以為
令其痛者為血淋不痛者為溺血

小薊

蒲黃

黑藕節

滑石

木通

生地黃

梔子

淡竹葉

當

鮮血

身解

卷三

三

湯

小薊飲子

小薊飲子

歸 甘草 各五分

此手足太陽藥也小薊藕節退熱散瘀生地涼血蒲黃止血生行血木

通降心肺之火下達小腸梔子散三焦鬱火由小便出竹葉涼心而清

肺肺為清水之源凡通淋者必先清肺滑石瀉熱而滑竅當歸養陰能引血歸經甘草益

陽能調中和氣也

傷元氣傷元氣活湯 治從高墜下惡血留于脇下疼痛不可忍者不問傷在何經惡血必留

主血故也

柴胡五錢當歸 枳實根 川山甲二錢甘草 紅花二錢桃仁五十夫大

黃酒一兩每服一兩加酒煎以利為度藥內無羌活而

此足厥陰藥也原文曰肝胆之經行于脇下屬厥陰少陽故以柴胡引

用為君以當歸活血脈以甘草緩其急為臣亦能生新血陽生則陰長

也以穿山甲花粉桃仁紅花破血潤血為佐以大黃湯滌敗血為使氣味相合各有攸歸痛自去矣

祛風之劑六經風寒濕燥火也六者之中風為首故經曰風者又曰風者善行而數變至其變化乃為地病無常方然致目風氣也飲食其熱也則消肌肉益天地間惟風無所不入人受之者恆為感目重則為傷又重則為中然必其人真氣虛虛故中風之症河間以為乘虛而入壯火所煎邪之所奏其氣必虛是也故中風之症河間以為將息失宜心火暴甚丹液以為熱生痰生熱熱生風東垣以為本氣自病若以風為虛者所以為治之有精熱化痰論分善血順氣之不同而不前用祛風之藥也○按內經風論痿痺論分善血順氣之不同同治法亦異丹溪常著論辨之然岐伯曰中風大法有因風痺其一也故治痺諸方亦次本門

小續命湯于治中風不省人事神氣微亂半身不遂筋急拘攣口眼喎

邪語重塞澁風濕腰痛痰火併多六經中風及剛柔二瘕陰虛火旺痰

省人事血虛中風左體為左不遂氣虛中風右體為右不遂風中筋脈則拘急風中口而則喎邪風中舌不則語澁風濕中腰則腰痛痙者項

[illegible]

白朮嘔逆加半夏語言蹇澀手足戰掉加石膏蒲竹瀝身痛發摘加羌活口渴加麥冬花粉煩渴多驚加犀角羚羊角汗多去麻黃杏仁加白朮舌燥去桂附加石膏

此六經中風之通劑也吳鶴皋曰麻黃杏仁麻黃湯也治太陽傷寒桂枝芍藥桂枝湯也治太陽中風此中風寒有表症者所必用也人參甘草補氣川芎芍藥補血此中風寒氣血虛者所必用也風淫故主以防風濕淫佐以防已寒淫佐以附子熱淫佐以黃芩病來雜擾故藥亦兼該也按中風有解表攻裏行中道三法內外症俱有者先解表而後攻裏醫其曰此治冬月直中風寒之方亦麻黃桂枝之變法六經有餘之表症須從汗解如有便溺阻滯宜三化湯麻仁丸通利之然邪之而表其氣必虛世間內傷者多此方終不可輕用也昂按此方為治風奎劑今人罕用然古今風方多從此方損益為治喻嘉言曰中風之病必有所兼兼寒則浮緊兼風則浮緩兼熱則浮數兼痰則浮滑兼氣則浮濡兼火則盛大兼陽虛則脈微兼陰虛則脈散或細如絲虛滑為頭痛緩遲為營衛衰然虛浮濕數正氣不足倘可補救急大數疾邪不

受制必死無疑若數大未至身疾尚有不死者○保命集曰厥陰為病不止脈沉遲手足厥逆腹中痛此為難治宜麻黃湯小續命汗之謂有表邪宿于內當散表邪則藏府自安矣又曰厥陰風為以風治風小續命消風散主之

易老六經加減法本方倍麻黃杏仁防風名麻黃續命湯治太陽中風無汗惡寒本方倍桂枝芍藥杏仁名桂枝續命湯治太陽中風有汗惡風本方去附子加石膏知母名白虎續命湯治陽明中風無汗身熱不惡寒本方加葛根倍桂枝黃芩名葛根續命湯治陽明中風身熱有汗惡風本方倍附子加乾薑甘草名附子續命湯治太陰中風無汗身涼本方倍桂附甘草名桂附續命湯治少陰中風有汗無熱本方加羌活連翹名羌活連翹續命湯治中風六經混淆繫之于少陽厥陰或肢節攣急或麻木不仁五微義自此方無分經絡不辨寒熱虛實雖多亦奚以為易老治分六經廢乎法法本方去防風防已附子白芍加當歸石膏即古今錄驗續命湯治中風

中風

痺身不自收口不能言局昧不知痛處或抱急不能轉側驗方法

人參加乾薑黃芩荆瀝即千金大續命湯通治五藏偏枯賊風

侯氏黑散治中風四肢煩重心中惡寒不足者熱而挾濕也心中濕

寒陽虛也外臺用治風癱

菊花分四十防風 白朮分十桔梗分八人參 茯苓 當歸 川芎 乾薑

桂枝 細辛 牡蠣 礬石分三 右末用溫酒調方寸七服二十日

日三再冷食服四十日共六十二日止則藥積腹中不下熟食即下矣

此手太陰少陰足厥陰藥也菊花秋生得金水之精能制火而平木木

平則風息火降則熱除故以為君防風細辛以祛風當歸川芎以養血

人參白朮以補氣黃芩以清肺熱桔梗以和膈氣茯苓通心氣而行脾

濕薑桂助陽分而達四肢牡蠣白礬酸軟清收又能化頑痰加酒服者

腦水
片也

以行藥勢也

喻嘉言曰治風而補風補風誰不能之至驟補之中而行

不勝以漸填其空竅則邪風盡去新風不受矣蓋藥性得冷則止得熱則行故又稱以宜冷食也中風入藏嚴防風邪乘虛透入心中故以菊

花為君仲景製方醫心獨創乃中風症首引此散豈非深服其長乎後世悉用腦筋引風入心真有其非者故舉金匱黑散風引二湯以明

附金匱風引湯大黃乾薑龍骨各四兩桂枝兩甘草杜蠟各二兩滑石

膏寒水石赤石脂白石脂紫石英各六兩枳實三指撮煮三沸溫服治

大人風引癰瘕小兒驚癇瘕瘕曰散上發氣氏用治脚氣按黑散風引

為仲景聖方而桂雲來金匱而解又云侯氏黑赤風引湯防已地黃湯

頭風摩膏藥石湯所上皆非中風歷節之症是宋人較正附入唐人之

方遂盡刪之又云仲景方書之祖復取侯氏方為法耶愚謂仲景多方

豈無祖述而必創自一人之手乎方若宋氏雖出自唐宋其可明耶但

煎煥必氣血不足之人風引湯用大黃為君又石藥居其大半獨不以

白藥之氣悍乎喻氏雖深贊之亦未之其果當以此治風而獲實驗乎

抑亦門外之揣摩云爾也若黑散之君菊花又加氣血解表除痰之藥

視此不同矣○昂按中風為危篤之症右方佳善頗少蓋錄給命黑散

搜風
活血
降火

風引諸藥要有
其源流焉耳

大秦丸湯

要機

治中風手足不能運掉舌強不能言語風邪散見不拘一

經者

經曰掌受血而能握足受血而能步又脾主四肢脾虛血弱不能

舌本木強也六經形症謂口開手撒眼合鼻衄吐沫遺尿直視頭搖諸

症也此則外無六經形症內無便溺阻滯為中經絡中之稍輕者也

秦艽

石膏

三當歸

洗白芍

酒川芎

生地

酒熟地

白朮

炒茯苓

甘草

炙黃芩

酒防風

羌活

獨活

白芷

一細辛

錢五

每服一兩兩

濕加生薑春夏加知母心下痞加枳殼此六經中風輕者之通劑也以

秦艽為社者祛一身之風也以石膏為臣者散胸中之火也羌活散木

陽之風

勝

白芷散陽明之風

川芎散厥陰之風

細辛獨活散少陰

之風

防風為風藥卒徒隨所引而無所不至者也大抵內傷必因外

感而發諸藥雖云搜風亦兼發表風藥多燥表藥多散故疎風必先養

血而解表亦必固裏當歸養血生地滋血芍藥活血芍藥飲陰和血

活則風散而舌本柔矣又氣能生血故用白朮茯苓甘草補氣以牡

樞脾運濕除則手足健矣又風能生熱故用黃芩清上石膏

瀉中生地涼下以其平逆上之火也補血之藥而行經散風之劑居其

大半特何以養血而益筋骨也天麻凡養血壯筋骨虛幾近理喻嘉言

曰此方既云養血而筋自柔何得多用風燥藥既云靜以養血何復用

風藥以動之足言與方悖矣偶論三化湯愈風湯及大秦丸湯皆似此

而非替昂按此方用之頗眾發效亦多未可與愈風三化同日語也此

蓋初中之時外扶表邪故用風藥以解表可用血藥氣藥以調表非能

下燥散者也治風有解表攻裏行中道三法內外症俱有者先解表而

後攻裏是也若愈風解表而風藥太多三

化攻裏而金川承氣則非中症所宜矣

附易老天麻丸天麻風牛膝筋草解風濕立參壯木調大杜仲使筋

骨相當歸和血生地真陰羌活骨節風附子行經蠶丸一方有獨

活五兩

三生飲 治中風卒然昏愈不省人事痰涎壅盛語言蹇澀等症

李東垣曰中風

非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四旬氣衰之極或憂喜忿怒傷其氣者多有此症壯盛之時無有也若虎盛者則開利之亦是形盛氣衰而如此耳按此

即東垣主乎氣之說

生南星一牛川烏皮生附子去皮木香二錢每服一兩加入參一兩煎

此足太陰陽明厥陰手少陽藥也南星辛烈散風除痰附子重酸溫脾

逐寒烏頭經蹠溫脾逐風二藥通行經絡無所不至皆用生者取其力

峻而行速也重加入參所以扶其正氣少佐木香所以行其逆氣也

附

曰觀東垣之論當以氣虛為主縱有風邪亦是乘虛而發經曰邪之所
聚其氣必虛是也當此之時當尋常藥無所能通達於上下或急以三
生飲一兩加入參一兩煎服即癒此乃行經治痰之劑斷閑攝王之將
必用人參兩許其義可也若道床下臥則不惟無益迫以取敗妙先
其明者附參酌其義可也若道床下臥則不惟無益迫以取敗妙先
多而生者附參酌其義可也若道床下臥則不惟無益迫以取敗妙先
其明者附參酌其義可也若道床下臥則不惟無益迫以取敗妙先

前加和藥傷脾胃宜導之藥

風

地黃飲子治中風舌瘡不能言足廢不能行此少陰氣厥不至名曰

風痺音肥急當溫之風非如癱瘓是也劉河間曰中風癱瘓非為肝木之

水虛寒不能制之則陰虛陽實而熱氣拂鬱心神皆同筋骨不用而卒

倒無知也亦有因喜怒悲恐五志過極而卒中者皆為熱其俗云風

者言未而忘其本也治宜和緩人感之名與中風可用風藥下藥南方

乎火之說蓋西北風氣剛勁虛人感之者與中風可用風藥下藥南方

半濕質易氣虛雖有中症而治

不同名類中風宜兼補養為治

熟地黃 巴戟心 山茱萸 肉苁蓉 酒附子 炮官桂 石斛 茯苓

石菖蒲 遠志 麥冬 五味子 等分每服五錢入薄荷少許薑棗

煎服
此乎是少陰太陰足厥陰藥也熟地以滋根本之陰巴戟苁蓉官桂附
子以退真元之火石斛安脾而秘氣山茱溫肝而固精菖蒲遠志茯苓
補心而通腎藏麥冬五味保肺以滋水源使水火相交精氣漸旺而風

不暢
遂邪
兩乳中
申問

順風勻氣散

治中風半身不遂口眼喎邪

半身不遂偏枯也經曰胃脈

火自息矣醫曰劉氏之論則以風為未而以火為本殊不知火之
矣故治中風又當以真陰虛為本但陰虛有二有陰中之水虛有陰中
之火虛火虛者專以河間地黃飲子為主水虛者當以六味地黃丸為
主果是水虛幸熱之藥與參耆之品俱不可加或曰風淫所勝治以辛
涼何故反用桂附使火盛制金不能平木而風木益甚耶曰此是腎虛
真陰失守孤陽發越若非桂附何以追復其散失之元陽其痰涎上湧
者水不歸元也而赤煩渴者火不歸元也惟桂附能引火歸元水火既
歸其元則水能生水木
不生風而風自息矣

急皆高偏枯男子發左女子發右不消舌轉可治蓋心是神機開發之
本胃是水穀充大之樞標本相得則肥中氣虛耗之宗氣盈溢分布四藏
三焦上下中外無不周備若標本相失宗氣虛耗分布不周于經脈則
偏枯不周于五藏則諸口眼喎邪者是陽明之脈使口環唇寒則筋急
熱則筋弛左寒右熱則左急而右緩右寒左熱則右急而左緩陽明筋急
金主繁縮風病而成筋縮木極似金反兼勝已之化燥之甚也治宜辛
涼不可用桂附○元戎曰酒濕之病亦能足痺症口眼喎邪半身不遂
舌強不正渾似中風當濕熱毒不可作風病治之而汗也衍義易簡言
同此

白朮

錢二

馬藥

錢半

人參

天麻

分五

白芷

蘇葉

木瓜

青皮

甘草

炙

沉香

磨三

加薑煎

此足厥陰陽明藥也邪之所聚其氣必虛偏枯喎僻或左或右蓋血脈

不周而氣不勻也天麻蘇葉以疎風氣烏藥滑沉以行滯氣參朮炙草

以補正氣疎之行之補之而氣勻矣氣勻則風順矣用木瓜者能于土

中瀉木調勞衛而伸筋也載復菴曰治風之法初得之即當順氣及其

血逆用是助天麻藥水見其能治也然順氣則可痰氣為氣則不可

和發丸治中風喎僻語謇痿痺肢緩骨痛及風邪走痛或十指麻木

川歸風氣風濕諸瘡痺腫痛熱流注也世俗謂之流火即內經所謂

行痺痛痺也十指麻木氣血不足或有濕痰死血在胃中也

稀簽草以五月五日七月七日九月九日採者佳不拘多少揀去血

風痺

蒸留枝葉花實酒拌蒸晒九次蜜丸九次加以酒蜜則苦寒之陰酒蒸

去而清香之美味見矣數不至九陰濁尚在則不能透骨驅風而却病也

此足少陰厥陰藥也稀簽能祛風散濕行大腸之氣加以酒蒸蜜丸氣

味清和故能補肝潤腎益氣強筋筋濕去則然風藥終燥若風痺由于脾

腎兩虛陰血不足不由風濕而得者亦忌服之唐成誦有進稀簽表云其草

金稜銀線素華紫葳葉相對頗類蒼耳臣喫百服眼目清明即至千

服發髮烏黑筋力輕健効驗多端昂按此藥不但搜風尤能勝濕濕去

則脾胃健而筋骨強凡中風挾濕者服之尤宜

牽正散方直抵治中風口眼喎邪無他證者足陽明之脉俠口環唇足太

藹痰熱太陽外中于風故牽急而喎邪也又曰木不及則金化縮短乘

之木為金乘則上寡于畏故口眼喎邪口目常動故風生焉耳鼻常靜

息焉故風白附子 僵蚕 金蠅 等分為末每二錢酒調服

此足陽明厥陰藥也吳鶴皋曰凡防之屬可以驅外風而內生之風非

其治也

所有熱則自生風與外感之風不同星夏之屬可以治濕痰而風虛之痰非其治

也三藥療內生之風治虛熱之痰得酒引之能入經而正口眼又曰白

附辛可祛風

白附去頭面之遊風蚕蠟能軟痰蠟能化痰散痰全蠟直走厥陰為治風

藥辛中有熱凡藥辛者必熱可使從風蚕蠟有毒可使破結藥有用熱以攻熱

用毒以攻毒者大易所謂同氣相求內經所謂衰之以其屬也

附攻容膏蓖麻子

一冰片三分其搗為膏寒月加乾薑附子錢各一左右囑貼

右右囑貼左即正或用鱖魚血或用蜣螂搗傳亦良蓋三物皆追風拔

毒之品也

附家已重

如聖飲節

治剛柔二瘰而赤項強頭搖口噤角弓反張與癰癧

音熾同

法瘰者太陽中風重感寒濕而為病也風則燥而動寒則引而緊濕則

挾濕則流出有汗為柔痙筋急而縮為瘰筋弛而緩為瘰仲縮不已為瘰瘰俗謂之摘是也

羌活 防風 白芷 柴胡 甘草 黃芩 半夏 川芎 芍藥

當歸 烏藥 加薑黃人薑汁竹瀝服柔痙加白木桂枝剛痙加蒼木

麻黃口噤咬牙大便實加大黃

此足太陽厥陰藥也羌防芎芷柴胡甘草辛甘以發散風邪用烏藥者

治風須順氣也用歸芍者治風先活血也用半夏竹瀝薑汁者風必挾

痰也用黃芩者風必生熱也柔痙加白木桂枝有汗欲其無汗剛痙加

蒼木麻黃無汗欲其有汗口齒屬陽明陽明實則口噤咬牙而便秘故

加大黃以泄胃熱也

瘰瘰

獨活湯

治風虛瘰瘰昏憤不覺或為寒熱筋急而縮為瘰後而瘰為

瘰瘰之象也肝虛而風乘之人于血脉則瘰瘰若在皮膚則為寒熱若移于所生則昏憤不覺也所生心也木能生火

獨活 羌活 防風 細辛 桂心 白微 當歸 芎藭 半夏

人參 茯神 遠志 葛蒲錢五 甘草錢二 每服一兩加薑棗煎

此手少陰足厥陰藥也肝屬風木而主筋故癰瘰為肝邪肝欲散急食

辛以散之二活防風祛風細辛桂心溫經半夏除痰芎歸辛散風而溫

和血血活則風散辛以散之即辛以補之也不喜條達故以散為補心為肝子肝

移熱于心則昏憤故以人參補心氣葛蒲開心敷茯神遠志安心神白

微鹹寒退熱而治厥使風靜火息血活神寧而癰瘰自已矣

濕寒死血 活絡丹 治中風手足不仁日久不愈經絡中有濕痰死血腿臂間忽有

一二點痛

川芎炮去脂皮 草烏炮去脂皮 胆星六兩 地龍即蚯蚓洗焙乾 乳香去油 沒藥另併三錢 酒九

酒下

此足太陰厥陰藥也吳鶴舉曰胆星辛烈所以燥濕痰二烏辛熱所以

散寒濕蚯蚓濕土所生欲其引烏星直達濕痰所結之處大易所謂同

氣相求也蚯蚓蟻聚風邪注于肢節久則血脉凝聚不行故用乳香沒

藥以消瘀血乳香活血能去風伸筋沒藥能散瘀血生新血二藥並能消腫止痛故每相須而行

消風散 治風熱上項頭目昏痛項背拘急鼻嚏聲重及皮膚頑麻癢疹

瘰癧婦人血風血風者婦人衝任二經為風熱傷致生血病也

荊芥 陳皮去白厚朴薑汁炒甘草炙五錢 防風 羌活 藿香 殭蚕洗炒

蛻川芎 茯苓 人參二兩 為末每服三錢茶湯下瘡癬酒下

此足太陽手太陰藥也羌防荊芎之辛浮以治頭目項背之風殭蚕蠶

蛻之清揚以去皮膚之風藿香厚朴以去惡散滿參苓甘橘以輔正助

中使風邪無留壅也

清空膏

垣東

治正偏頭痛年深不愈及風濕熱上壅頭目及腦苦痛不止

偏頭痛者少陽相火也丹溪曰有痰者多左屬風屬火多血虛右屬痰屬熱多氣虛準經曰醫書多分頭痛頭風為二門然一病也淺而近者名頭痛深而遠者為頭風當驗其邪所從來而治之

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

羌活

防風

一兩

柴胡

七錢

川芎

五錢

甘草

炙兩半

為末

每服

三錢茶調如膏曰湯送下如少陰頭痛如細辛太陰頭痛脉緩有痰去

羌活防風川芎甘草加半夏如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一

半加柴胡一倍

散少陽相火

如自汗發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎

湯加白芷

李東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足寒而氣逆也太陰少陰三經雖不上頭然痰與氣壅于膈中頭上氣不得暢

而為痛也

此足太陽少陽藥也頭為六陽之會其象為天清空之位也風寒濕熱

于之則濁陰上壅而作實矣羌防入太陽柴胡入少陽皆辛輕主升祛

風勝濕之藥川芎入厥陰為通陰陽血氣之使甘草入太陰散寒而緩

痛辛甘發散為陽也芩連苦寒以羌防之屬升之則能去濕熱于高顙

之上矣此藥通川酒炒非獨制其寒欲其上升也丹溪曰東垣情空膏諸

又云治少陽頭痛如痛在太陽潛陰者勿川益附錄頭痛也○頭痛用

羌活防風柴胡川芎升麻細辛藜蘆之異者分各標也用黃芩黃連黃

柏知母石膏生地之與者分各藏瀉火也用茯苓澤瀉者導濕也用參

耆者補氣也用芍歸者養血也王海藏曰熱在至高之分當以輕劑抑

之後緩治也若急服之

上熱未除中寒生矣

胃風湯治風冷乘虛客于腸胃食泄注下完穀不化及腸風下血又

治風虛能食牙關緊閉手足癱瘓肉瞤而腫名曰胃風胃受風氣不和

化謂之食泄胃有風濕流人大腸故下而陽明胃脉入牙縫故牙緊脾
生四肢故癱瘓胃主肌肉故肉瞤陽明之脉營于面故面腫癱瘓手足
抽掣也
動也
人參 白朮 茯苓 當歸 芍藥 桂枝 等分加粟米百

餘粒煎

此即十全湯去
黃耆地黃甘草

此足陽明厥陰藥也。胃風者胃虛而風邪乘之也。風屬肝木，不能剋脾土。

故用參朮茯苓以補脾氣，而益衛當歸川芎以養肝血，而調榮芍藥瀉

肝而能和脾。肉桂散風而能平木。木不得桂而枯，刺桂針木根，故能住泄。

瀉而療風濕也。又曰白朮茯苓能壯脾而除濕，用芎肉桂能入血而驅

風。王機微義曰：此方名治風而實非治風，乃補血和血，益胃之藥。血病而挾濕者，實可倚仗。

東垣胃風湯升麻白芷一分麻黃一分葛根各一錢柴胡各一錢羌活各一錢本蒼朮

曼荆草各五分黃柏各五分歸身各五分加薑棗煎亦治胃風症。喻嘉言曰：風人

食益風能生熱，即內輕痺成爲消中之聖也。是方能去其風，不去其熱，

以熱必隨風而解耳。又曰必加竹瀝花粉石膏等藥，發其地氣，汁甘寒之

藥入升麻葛根甘草爲劑，始爲克當。或問二藥補散不同，而所治其一

症何歟？喻嘉言曰：按風成爲寒熱，乃風入胃中而釀營衛之偏勝。此方

乃驅胃風使從外解之藥。若夫久風爲痰，泄則風已入裏，又當用人參

爲君，桂枝白朮爲臣，茯苓甘草爲佐，使而祛風于內。此表裏之權衡，內

痛風

經之要旨也

上中下通用痛風丸丹痛風有寒有濕有熱有痰有血之不同此為通

治按此即內經所謂行痛痛痺也經曰風寒濕三者雜合而為痺也蓋

血兩虛其症為加重矣

黃柏酒炒蒼朮洗南星薑汁神麴炒川芎桃仁去皮龍胆草行防已

白芷兩羌活威靈仙酒拌上桂枝三錢紅花二錢麴糊丸

此治痛風之通劑也黃柏清熱蒼朮燥濕此二妙散也龍胆瀉火防已

行水四者所以治濕與熱也南星燥痰散風桃仁紅花活血去瘀川芎

為血中氣藥四者所以治痰與血也羌活祛百節之風白芷祛頭面之

風桂枝威靈仙祛臂脛之風四者所以治風也加神麴者所以消中州

陳積之氣也疎風以宣于上瀉熱利濕以泄手下活血燥痰消滯以調

風痺

其中所以能兼治而通用也症不兼者以意消息可矣

丹溪曰大法痛風用蒼朮南星

川芎當歸白芷酒岑在上者加羌活桂枝威靈仙在下者加牛膝防己木通黃柏薄桂能橫行手臂領南星蒼朮諸藥至痛處

史國公藥酒方

治中風語言蹇澀手足拘攣半身不遂痿痺不仁

風中舌本也半身不遂邪併于虛也手足拘攣風燥其筋而血不濡也痿痺不仁風而兼濕頑麻痠楚也

羌活

防風

白朮

土炒

當歸

川牛膝

酒洗

草薢

杜仲

姜汁炒

松節

虎脰骨

酥炙

鱉甲

醋炙

晚蚕砂

炒二

秦艽

蒼耳子

炒

槐碎

枸杞

八兩

為粗末

絹袋盛浸

無灰酒

三十觔

煮熟

退火

煎服

每日

數次

常

令醞醱不斷

此足厥陰藥也防風羌活蒼耳秦艽松節茄根五砂革薢既以祛風兼

以燥濕

松節能除骨節間之風茄根散諸節枸杞杜仲牛膝補陰潤燥

養血營筋

白朮

補氣

而健脾

脾主

虎脰

驅風

而壯骨

風從虎故虎骨治

風虎雖死猶立不

其氣力皆在前腰且腰骨能
入手足若腰脊病又當用脊骨
驚甲亦厥陰血分之藥能益陰血而去

肝風風濕去氣血旺則病除矣

蠲痺湯氏治中風身體煩痛項背拘急手足冷痺腰膝沉重舉動艱難

或重痛而舉動艱難也經曰營虛則不仁衛虛則不用不仁收喘不知
痛發也不用手足不為人用也○或伯曰中風大法有四一曰偏枯半
身不遂也二曰風痺身無疼痛四收不收也三曰風癱奄忽不知人也
四曰風痺也

痺類風狀也

黃耆炙當歸酒洗赤芍酒炒羌活 防風 片芩黃酒炒甘草炙 加薑棗

煎

此足太陽厥陰藥也辛能散寒風能勝濕防風羌活除濕而疎風氣通

則血活血活則風散黃耆炙草補氣而實衛黃耆者燭防風合當歸赤芍

活血而和營薑黃理血中之氣能入手足而祛寒濕也華繩曰凡風痺

醫方集解 卷之三 蠲痺湯 三

風寒濕氣

真氣不周而病者也治之不以黃耆為君人參歸芍為臣防風桂枝鉤
藤刺瀝竹葉薤白非汁葛汁梨汁乳汁之屬為佐而徒雜香乎烏附薑
獨以酒營而耗衛如
此死者賢醫殺之也

三痺湯

治氣血凝滯手足拘攣風寒濕三痺經曰風寒濕三者雜合而

痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺也以此冬遇此者為骨痺以春遇
此者為筋痺以夏遇此者為脉痺以至陰遇此者為肌痺以秋遇此者
為皮痺痺在骨則重在手膝則重而凝而不流在筋則屈伸不利在
肉則不仁在皮膚則寒者寒氣多也其寒者陽氣少陰氣多也其熱者
陽氣多陰氣少也故為痺熱其多汗而濡者濕氣也濕氣少陰氣盛故汗出而濡也

人參 黃耆 茯苓 甘草 當歸 川芎 白芷 生地黃 杜仲

薑汁炒 川牛膝 川續斷 桂心 細心 秦艽 川獨活 防風

等分加薑棗煎

此是三陰藥也喻嘉言曰此方用參耆四物一派補藥內加防風秦艽
以勝風濕桂心以勝寒細心獨活以通腎氣凡治三氣襲虛而成痺患

風藥
獨活

者宜準諸此昂按風痺諸方大約祛風勝濕獨活之藥多而養血補氣固本之藥少惟此方專以補養為主而以治三氣之藥從

之散藥得補藥以行其勢補正驅邪尤易于見功故喻氏取之

獨活寄生湯

金治肝腎虛熱風濕內攻腰膝作痛冷痺無方屈伸不使

腎水藏也虛則寒濕之氣乘之故腰膝作痛而痛冷痺者陰邪勝也肝主筋腎主骨靈樞曰能屈而不能伸者病在前能伸而不能屈者病在

一骨

獨活 桑寄生

如無真者以續斷代之

秦艽

防風

細辛

當歸

酒洗芍藥 酒炒川

芎藭

酒洗熟地黃杜仲 薑汁炒牛膝

人參

茯苓

甘草

桂心

等

分每服四錢

此即前湯除黃耆續斷加桑寄生

此足少陰厥陰藥也獨活細辛入少陰通血脉偕秦艽防風踈經升陽

以祛風桑寄生益氣血祛風濕偕杜仲牛膝健骨強筋而固下芎歸芍

地所以活血而補陰參桂苓所以益氣而補陽辛溫以散之甘溫以

驚風

補之使血氣足而風濕除則肝腎強而痺痛愈矣朱丹溪曰久服痛必用官桂以開之方止

腹脇痛亦然

本方除獨活寄生加羌活續斷名羌活續斷湯治同

沉香天麻丸寶鑑治小兒因驚發搐痰多眼白癰癥筋攣小兒神氣尚弱驚則神思無依

又動于肝風風火相弱故痰壅心隔而筋攣搐掣

羌活五錢獨活四錢沉香 益智仁 川烏二錢附子炮天麻 防風 半夏

三錢當歸 甘草 殭蠶錢 每服五錢薑三片煎

此足厥陰藥也寶鑑曰恐則氣下精怯而上焦閉以羌活獨活苦溫引氣上行又入太陽為引故以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛溫以補氣血之不足又養胃氣故以為臣烏附益智大辛溫行陽退陰又治客寒犯胃腎主五液入脾為涎以生薑半夏燥濕行痰沉香辛溫

中風
取竟

體重氣清去怯安神為使

通頂散

治初中風不知人事口噤不開

風鼓大熱痰涎上壅故不省人事風冷之氣客于胸中滯而不

能發散口
禁不開

藜蘆

甘草生用

細辛

人參

川芎

石膏錢五

為末用一字吹入鼻

中有噤者肺氣未絕可治

此手太陰少陰藥也吳鶴皋曰中風不省人事病矣亟矣非平藥可以

開其壅塞故用藜蘆與人參細辛取其相反而相用也

藜蘆苦寒有毒入口即吐能通

膈頂令人覺下人參細辛肺苦氣上逆故用石膏之重以墜之

氣即大也

痰隨火湧故用石膏甘草之平以緩之芎藭之用取其清氣利竅而已

芎藭

升清陽而開諸鬱為通陰陽血氣之便○凡諸卒中凡厥逆胃皆當發

發

表運魂湯用麻黃桂枝清魂湯用荆芥及用皂角半夏臨鼻取嚏藜蘆

砒石所齒取痰皆所以開痰三焦使表邪

流通也中暑忌用冷水閉表亦同此意

通頂散

通頂散

通頂散

三

紫

烏梅擦牙關方

治中風口噤不開

胃腸明之藥循煩事入齒縱風寒中
之輕則戰慄鼓領重則口噤不開有

中風而口開不噤
者筋先絕也不治

烏梅

揩擦牙齦涎出即開

此足陽明厥陰藥也酸先入筋木能尅土

酸屬木陽
明胃屬土使牙關酸軟則開

矣若以鐵器攪之恐傷其齒也